

# Vos médicaments

## Antibiotiques intraveineux

En tant que patient, et avec l'aide de nos équipes soignantes, vous avez un rôle actif à jouer dans la bonne gestion de vos médicaments.

Retrouvez ici les documents informatifs élaborés par nos pharmaciens hospitaliers, en collaboration avec nos médecins.



**Ces fiches d'informations sont mises à disposition des patients du CHU UCL Namur. Leur utilisation doit faire l'objet d'un accompagnement par nos équipes médicales, en particulier lors de la première prescription du médicament concerné par la fiche.**

CLIQUEZ SUR LE NOM DU MÉDICAMENT  
POUR ACCÉDER À SA FICHE INFORMATIVE

AMIKACINE®/AMUKIN® .....	2
CEFTRIAXONE® .....	4
MEROPENEM®/MERONEM® .....	6
NEGABAN® .....	8
TARGOCID® .....	10
TYGACIL®/TIGECYCLINE® .....	12

### INFORMATIONS



**Vous vous posez d'autres questions concernant votre traitement? N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou votre pharmacien. Rediscutez de ce médicament avec votre médecin traitant ou spécialiste au minimum une fois par an.**

- Ce document informatif a été élaboré par des pharmaciens hospitaliers du CHU UCL Namur, en collaboration avec des médecins. Cette fiche n'est pas exhaustive : pour une information plus complète sur le médicament et ses effets indésirables, veuillez-vous référer à la notice qui se trouve dans la boîte de votre médicament.

# AMIKACINE AMUKIN®

**500mg ou 1 g**

(amikacine)

Nom du patient : \_\_\_\_\_

Médecin ayant initié le traitement (cachet) : \_\_\_\_\_

Dose : \_\_\_\_\_ flacon(s) de \_\_\_\_\_ g \_\_\_\_\_ fois par jour

par voie intraveineuse

Date de début : \_\_\_\_\_

Durée/Date de fin : \_\_\_\_\_

## Pourquoi prenez-vous l'Amikacine?

L'Amikacine est un antibiotique utilisé pour traiter certaines infections causées par des bactéries.

## Comment allez-vous recevoir l'Amikacine?

- ✦ L'Amikacine est administrée par voie intraveineuse (dans une veine).
- ✦ Un(e) infirmier(e) viendra vous administrer l'Amikacine une fois par jour à votre domicile. **Il/elle effectuera toutes les manipulations.**
- ✦ Les flacons d'Amikacine sont prêts à l'emploi. Ils ne doivent pas être dilués.
- ✦ L'infirmier(e) connectera le flacon à votre cathéter. Le liquide s'écoulera dans votre veine **pendant 30 à 60 minutes.**

## Quels sont les effets indésirables possibles avec l'Amikacine?

A côté de ses effets bénéfiques, l'Amikacine peut présenter des effets indésirables, même si tous les patients n'y sont pas sensibles. Voici les effets indésirables principaux de l'Amikacine. Le but est de vous informer pour que vous puissiez les reconnaître et les prendre en charge.

- ✦ Acouphènes, grondements dans les oreilles, diminution ou perte d'audition.
- ✦ Vertiges, étourdissements.
- ✦ Engourdissements, picotements, contraction des muscles ou faiblesse musculaire.
- ✦ Nausées, vomissements.
- ✦ Toxicité aux reins : diminution ou absence d'urine. Votre médecin contrôlera régulièrement votre fonction rénale avec des prises de sang.

## Soyez vigilant(e)

### CONTACTEZ VOTRE ÉQUIPE SOIGNANTE :

- ✦ Immédiatement si vous ressentez un des symptômes suivants :
  - grondements dans les oreilles et diminution ou perte d'audition, vertiges ;
  - engourdissements, picotements, contraction des muscles ou difficultés à respirer ou faiblesse musculaire ;
  - absence d'urine ;
  - réaction allergique subite et sévère = réaction cutanée avec démangeaisons, chute de tension, gonflement brutal de la gorge, du visage ou de la bouche pouvant causer des difficultés à respirer, oppression à la poitrine, gonflement de ganglions.
- ✦ En cas de fièvre (température supérieure à 38°C).
- ✦ Si les symptômes liés à l'infection ne s'améliorent pas ou s'aggravent.
- ✦ Si vous devez prendre un autre médicament.
- ✦ Si vous avez un effet indésirable inquiétant ou un nouveau symptôme inexpliqué.

## Comment conserver l'Amikacine?

- ✦ Gardez les flacons d'Amikacine hors de portée et de la vue des enfants.
- ✦ Conservez les flacons dans leur emballage, **à température ambiante, à l'abri de la lumière et de l'humidité.**
- ✦ Évitez les endroits chauds et humides (comme la salle de bain).

## Conseils qui pourraient vous être utiles

- ✦ N'interrompez pas le traitement par Amikacine sans avis médical.
- ✦ L'Amikacine peut interagir avec d'autres médicaments (ciclosporine, tacrolimus, des diurétiques, certaines chimiothérapies...). Cela peut augmenter les effets indésirables de l'Amikacine. Informez votre équipe soignante si vous devez prendre un autre médicament.
- ✦ Conservez toujours avec vous une liste complète et actualisée de vos médicaments (avec ou sans ordonnance), vitamines et autres produits naturels. Remettez-en une copie à votre médecin et pharmacien. Il est important de leur indiquer tout changement.
- ✦ Prévenez tout professionnel de la santé, intervenant dans votre traitement, de la prise d'Amikacine (médecins, pharmaciens, dentistes, infirmiers à domicile...).
- ✦ Prévenez votre médecin si vous êtes enceinte ou allaitez.
- ✦ Ne jetez pas les flacons restants à la poubelle (toxique pour l'environnement). Ramenez-les à votre pharmacien de ville ou à la pharmacie de l'hôpital.

## Notes personnelles

### INFORMATIONS



**Vous vous posez d'autres questions concernant votre traitement? N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou votre pharmacien.**

- ❶ Ce document informatif a été élaboré par des pharmaciens hospitaliers et médecins du CHU UCL Namur et du HOST RHN. Cette fiche n'est pas exhaustive : pour une information plus complète sur le médicament et ses effets indésirables, veuillez-vous référer à la notice qui se trouve dans la boîte de votre médicament.
- ❷ Retrouvez l'ensemble des fiches médicaments en ligne sur notre site web : [chuuclnamur.be/vos-medicaments](http://chuuclnamur.be/vos-medicaments).

# CEFTRIAZONE

**1 ou 2 g**

(ceftriaxone)

Nom du patient : \_\_\_\_\_

Médecin ayant initié le traitement (cachet) : \_\_\_\_\_

Dose : \_\_\_\_\_ flacon(s) de \_\_\_\_\_ g \_\_\_\_\_ fois par jour

par voie intraveineuse

Date de début : \_\_\_\_\_

Durée/Date de fin : \_\_\_\_\_

## Pourquoi prenez-vous Ceftriaxone?

La Ceftriaxone est un antibiotique utilisé pour traiter certaines infections causées par des bactéries.

## Comment allez-vous recevoir Ceftriaxone?

- ✦ La Ceftriaxone est administrée par voie intraveineuse (dans une veine).
- ✦ Un(e) infirmier(e) viendra vous administrer la Ceftriaxone une à deux fois par jour à votre domicile.
- ✦ **Il/elle effectuera toutes les manipulations.**

### 1. RECONSTITUTION ET DILUTION

L'infirmier(e) insérera, d'une part, une aiguille de transfert bidirectionnelle dans l'opercule désinfecté du flacon d'antibiotique et d'autre part, dans l'orifice de connexion de la poche de perfusion (NaCl 0,9% 100 ou 250 mL).

Il/elle fera pression sur la poche pour que la solution dissolve la poudre du flacon. Il/elle agitera très fort le flacon jusqu'à dissolution complète (+/- 60 secondes).

Par pression, l'infirmier(e) transférera la solution dissoute dans la poche en maintenant la poche vers le bas.

L'infirmier(e) retirera l'aiguille de transfert et insérera la trousse à perfusion. Ensuite, il/elle homogénéisera la poche (dans cet ordre, pour éviter la perte de produit).

### 2. ADMINISTRATION

L'infirmier(e) connectera la poche à votre cathéter. Le liquide s'écoulera dans votre veine pendant 30 minutes.



## Quels sont les effets indésirables possibles avec Ceftriaxone?

A côté de ses effets bénéfiques, la Ceftriaxone peut présenter des effets indésirables, même si tous les patients n'y sont pas sensibles. En général, la Ceftriaxone est bien tolérée chez les patients. Voici les effets indésirables principaux de la Ceftriaxone. Le but est de vous informer pour que vous puissiez les reconnaître et les prendre en charge.

- ✦ **Diarrhées**, parfois des nausées et vomissements.
- ✦ **Eruptions cutanées** (boutons ou rougeurs sur la peau), **démangeaisons**.
- ✦ Maux de tête, étourdissement, confusion.
- ✦ **Augmentation des enzymes du foie** : cela sera contrôlé par des prises de sang réalisées par votre médecin.

## Soyez vigilant(e)

### CONTACTEZ VOTRE ÉQUIPE SOIGNANTE :

- ✦ Immédiatement si vous ressentez un des symptômes suivants :
  - réaction allergique subite et sévère = réaction cutanée avec démangeaisons, chute de tension, gonflement brutal de la gorge, du visage ou de la bouche pouvant causer des difficultés à respirer, oppression à la poitrine, gonflement de ganglions ;
  - éruptions cutanées douloureuses et/ou étendues à plusieurs parties du corps qui peuvent être accompagnées de fièvre.
- ✦ En cas de diarrhée sévère ou persistante, ou en présence de sang ou de glaires dans les selles (substances translucides).
- ✦ En cas de fièvre (température supérieure à 38°C).
- ✦ Si les symptômes liés à l'infection ne s'améliorent pas ou s'aggravent.
- ✦ Si vous devez prendre un autre médicament.
- ✦ Si vous avez un effet indésirable inquiétant ou un nouveau symptôme inexpliqué.

## Comment conserver la Ceftriaxone?

- ✦ Gardez les flacons de Ceftriaxone hors de portée et de la vue des enfants.
- ✦ Conservez les flacons dans leur emballage à **température ambiante, à l'abri de la lumière et de l'humidité**.
- ✦ Evitez les endroits chauds et humides (comme la salle de bain).
- ✦ Après reconstitution des flacons ou dilution dans la poche par votre infirmier(e), la solution doit être immédiatement administrée.

## Conseils qui pourraient vous être utiles

- ✦ N'interrompez pas le traitement par Ceftriaxone sans avis médical.
- ✦ La Ceftriaxone ne doit pas couler dans la veine en même temps que certains médicaments (par exemple le calcium, une alimentation parentérale, la Vancomycine, le Fluconazole, l'Amikacine...). Votre médecin vérifiera les compatibilités.
- ✦ La Ceftriaxone peut interagir avec d'autres médicaments (comme les anticoagulants anti-vitamines K (Sintrom...)). Informez votre équipe soignante si vous devez prendre un autre médicament.
- ✦ Conservez toujours avec vous une liste complète et actualisée de vos médicaments (avec ou sans ordonnance), vitamines et autres produits naturels. Remettez-en une copie à votre médecin et pharmacien. Il est important de leur indiquer tout changement.
- ✦ Prévenez tout professionnel de la santé, intervenant dans votre traitement, de la prise de Ceftriaxone (médecins, pharmaciens, dentistes, infirmiers à domicile...).
- ✦ Prévenez votre médecin si vous êtes enceinte ou allaitez.
- ✦ Ne jetez pas les flacons restants à la poubelle (toxique pour l'environnement). Ramenez-les à votre pharmacien de ville ou à la pharmacie de l'hôpital.

## Notes personnelles

### INFORMATIONS



**Vous vous posez d'autres questions concernant votre traitement? N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou votre pharmacien.**

- ❶ Ce document informatif a été élaboré par des pharmaciens hospitaliers et médecins du CHU UCL Namur et du HOST RHN. Cette fiche n'est pas exhaustive : pour une information plus complète sur le médicament et ses effets indésirables, veuillez-vous référer à la notice qui se trouve dans la boîte de votre médicament.
- ❶ Retrouvez l'ensemble des fiches médicaments en ligne sur notre site web : [chuuclnamur.be/vos-medicaments](http://chuuclnamur.be/vos-medicaments).

# MEROPENEM MERONEM®

**1 g**

(meropenem)

Nom du patient : \_\_\_\_\_

Médecin ayant initié le traitement (cachet) : \_\_\_\_\_

Dose : \_\_\_\_\_ flacon(s) de \_\_\_\_\_ g \_\_\_\_\_ fois par jour

par voie intraveineuse

Date de début : \_\_\_\_\_

Durée/Date de fin : \_\_\_\_\_

## Pourquoi prenez-vous le Meropenem?

Le Meropenem est un antibiotique utilisé pour traiter certaines infections causées par des bactéries.

## Comment prendre le Meropenem?

- ✦ Le Meropenem est administrée par voie intraveineuse (dans une veine).
- ✦ Un(e) infirmier(e) viendra vous administrer le Meropenem une ou deux fois par jour à votre domicile.
- ✦ **Il/elle effectuera toutes les manipulations.**

### 1. RECONSTITUTION ET DILUTION

L'infirmier(e) insérera, d'une part, une aiguille de transfert bidirectionnelle dans l'opercule désinfecté du flacon d'antibiotique et d'autre part, dans l'orifice de connexion de la poche de perfusion (NaCl 0,9% 100 ou 250 mL).

Il/elle fera pression sur la poche pour que la solution dissolve la poudre du flacon. Il/elle agitera le flacon jusqu'à dissolution complète.

Par pression, l'infirmier(e) transférera la solution dissoute dans la poche en maintenant la poche vers le bas.



L'infirmier(e) retirera l'aiguille de transfert et insérera la trousse à perfusion. Ensuite, il/elle homogénéisera la poche (dans cet ordre, pour éviter la perte de produit).

### 2. ADMINISTRATION

L'infirmier(e) connectera la poche à votre cathéter. Le liquide s'écoulera dans votre veine pendant 15 à 30 minutes.

## Quels sont les effets indésirables possibles avec la Témocilline?

A côté de ses effets bénéfiques, le Meropenem peut présenter des effets indésirables, même si tous les patients n'y sont pas sensibles. Voici les effets indésirables principaux du Meropenem. Le but est de vous informer pour que vous puissiez les reconnaître et les prendre en charge.

- ✦ **Diarrhées**, parfois nausées, vomissements, douleurs au ventre, constipation.
- ✦ **Eruptions cutanées** (boutons ou rougeurs sur la peau), **démangeaisons**, urticaire.
- ✦ Maux de tête, confusion.
- ✦ Picotement dans les mains.
- ✦ **Augmentation des enzymes du foie** : cela sera contrôlé par des prises de sang réalisées par votre médecin.

## Soyez vigilant(e)

### CONTACTEZ VOTRE ÉQUIPE SOIGNANTE :

- ✦ Immédiatement si vous ressentez un des symptômes suivants :
  - en cas de réaction allergique subite et sévère = réaction cutanée avec démangeaisons, chute de tension, gonflement brutal de la gorge, du visage ou de la bouche pouvant causer des difficultés à respirer, oppression à la poitrine ;
  - éruptions cutanées douloureuses et/ou étendues à plusieurs parties du corps qui peuvent être accompagnées de fièvre.
- ✦ En cas de diarrhée sévère ou persistante, ou en présence de sang ou de glaires dans les selles (substances translucides).
- ✦ En cas de fièvre (température supérieure à 38°C).
- ✦ Si les symptômes liés à l'infection ne s'améliorent pas ou s'aggravent.
- ✦ Si vous devez prendre un autre médicament.
- ✦ Si vous avez un effet indésirable inquiétant ou un nouveau symptôme inexplicable.

## Comment conserver le Meropenem?

- ✦ Gardez les flacons de Meropenem hors de portée et de la vue des enfants.
- ✦ Conservez les flacons dans leur emballage à **température ambiante, à l'abri de la lumière et de l'humidité.**
- ✦ Evitez les endroits chauds et humides (comme la salle de bain).
- ✦ Après reconstitution des flacons ou dilution dans la poche de perfusion, la solution doit être immédiatement administrée.

## Conseils qui pourraient vous être utiles

- ✦ N'interrompez pas le traitement par Meropenem sans avis médical.
- ✦ Il est déconseillé de prendre le Meropenem pendant la grossesse. Le Meropenem ne doit pas être pris pendant l'allaitement.
- ✦ Le Meropenem peut interagir avec d'autres médicaments (p. ex. l'acide valproïque, warfarine). Cela peut augmenter les effets indésirables des médicaments ou diminuer leur efficacité. Informez votre équipe soignante si vous devez prendre un autre médicament.
- ✦ Conservez toujours avec vous une liste complète et actualisée de vos médicaments (avec ou sans ordonnance), vitamines et autres produits naturels. Remettez-en une copie à votre médecin et pharmacien. Il est important de leur indiquer tout changement.
- ✦ Prévenez tout professionnel de la santé, intervenant dans votre traitement, de la prise de Meropenem (médecins, pharmaciens, dentistes, infirmiers à domicile...).
- ✦ Ne jetez pas les flacons restants à la poubelle (toxique pour l'environnement). Ramenez-les à votre pharmacien de ville ou à la pharmacie de l'hôpital.

## Notes personnelles

### INFORMATIONS



#### **Vous vous posez d'autres questions concernant votre traitement? N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou votre pharmacien.**

- ❶ Ce document informatif a été élaboré par des pharmaciens hospitaliers et médecins du CHU UCL Namur et du HOST RHN. Cette fiche n'est pas exhaustive : pour une information plus complète sur le médicament et ses effets indésirables, veuillez-vous référer à la notice qui se trouve dans la boîte de votre médicament.
- ❶ Retrouvez l'ensemble des fiches médicaments en ligne sur notre site web : [chuuclnamur.be/vos-medicaments](http://chuuclnamur.be/vos-medicaments).

# NEGABAN®

**1 ou 2 g**

(*témocilline*)

Nom du patient : \_\_\_\_\_

Médecin ayant initié le traitement (cachet) : \_\_\_\_\_

Dose : \_\_\_\_\_ flacon(s) de \_\_\_\_\_ g \_\_\_\_\_ fois par jour

par voie intraveineuse

Date de début : \_\_\_\_\_

Durée/Date de fin : \_\_\_\_\_

## Pourquoi prenez-vous la Témocilline?

La Témocilline est un antibiotique utilisé pour traiter certaines infections causées par des bactéries.

## Comment prendre la Témocilline?

- ✦ La Témocilline est administrée par voie intraveineuse (dans une veine).
- ✦ Un(e) infirmier(e) viendra vous administrer la Témocilline une ou deux fois par jour à votre domicile.
- ✦ **Il/elle effectuera toutes les manipulations.**

### 1. RECONSTITUTION ET DILUTION

L'infirmier(e) insérera, d'une part, une aiguille de transfert bidirectionnelle dans l'opercule désinfecté du flacon d'antibiotique et d'autre part, dans l'orifice de connexion de la poche de perfusion (NaCl 0,9% ou Glucose 5% 100 mL).

Il/elle fera pression sur la poche pour que la solution dissolve la poudre du flacon. Il/elle agitera le flacon jusqu'à dissolution complète.

Par pression, l'infirmier(e) transfèrera la solution dissoute dans la poche en maintenant la poche vers le bas.

L'infirmier(e) retirera l'aiguille de transfert et insérera la trousse à perfusion. Ensuite, il/elle homogénéisera la poche (dans cet ordre, pour éviter la perte de produit).



### 2. ADMINISTRATION

L'infirmier(e) connectera la poche à votre cathéter. Le liquide s'écoulera dans votre veine pendant 30 à 40 minutes.

## Quels sont les effets indésirables possibles avec la Témocilline?

A côté de ses effets bénéfiques, la Témocilline peut présenter des effets indésirables, même si tous les patients n'y sont pas sensibles. Voici les effets indésirables principaux de la Témocilline. Le but est de vous informer pour que vous puissiez les reconnaître et les prendre en charge.

- ✦ **Eruptions cutanées** (boutons ou rougeurs sur la peau), **démangeaisons**.
- ✦ **Diarrhées**.
- ✦ **Confusion**.

## Soyez vigilant(e)

### CONTACTEZ VOTRE ÉQUIPE SOIGNANTE :

- ✦ Immédiatement si vous ressentez un des symptômes suivants :
  - en cas de réaction allergique subite et sévère = réaction cutanée avec démangeaisons, chute de tension, gonflement brutal de la gorge, du visage ou de la bouche pouvant causer des difficultés à respirer, oppression de la poitrine ;
  - en cas de réaction d'hypersensibilité retardée (parfois plus de 48h après le début du traitement) = éruption cutanée avec démangeaisons, fièvre, taches sur la peau ne s'effaçant pas à la pression, douleurs aux muscles ;
  - en cas de convulsions.
- ✦ En cas de diarrhée sévère ou persistante, ou en présence de sang ou de glaires (substances translucides) dans les selles.
- ✦ En cas de fièvre (température supérieure à 38°C).
- ✦ Si les symptômes liés à l'infection ne s'améliorent pas ou s'aggravent.
- ✦ Si vous devez prendre un autre médicament.
- ✦ Si vous avez un effet indésirable inquiétant ou un nouveau symptôme inexpliqué.

## Comment conserver la Témocilline?

- ✦ Gardez les flacons de Témocilline hors de portée et de la vue des enfants.
- ✦ Conservez les flacons dans leur emballage **au frigo** (entre 2 et 8°C), dans un endroit propre et sec : si possible, dans un frigo spécifique sans nourriture ou à un étage de votre frigo sans aucun autre aliment.
- ✦ Si vous remarquez que vos flacons sont à température ambiante, remettez-les au frigo. En période de chaleur (température supérieure à 25°C), contactez votre équipe soignante.
- ✦ Après reconstitution des flacons ou dilution dans la poche par votre infirmier(e), la solution doit être immédiatement administrée.

## Conseils qui pourraient vous être utiles

- ✦ N'interrompez pas le traitement par Témocilline sans avis médical.
- ✦ La Témocilline peut interagir avec d'autres médicaments (par exemple Sintrom®, Méthotrexate...). Cela peut augmenter les effets indésirables. Informez votre équipe soignante si vous devez prendre un autre médicament.
- ✦ Conservez toujours avec vous une liste complète et actualisée de vos médicaments (avec ou sans ordonnance), vitamines et autres produits naturels. Remettez-en une copie à votre médecin et pharmacien. Il est important de leur indiquer tout changement.
- ✦ Prévenez tout professionnel de la santé intervenant dans votre traitement de la prise de Témocilline (médecins, pharmaciens, dentistes, infirmiers à domicile...).
- ✦ Il est préférable d'éviter de prendre de la Témocilline pendant la grossesse et l'allaitement.
- ✦ Ne jetez pas les flacons restants à la poubelle (toxique pour l'environnement). Ramenez-les à votre pharmacien de ville ou la pharmacie de l'hôpital.

## Notes personnelles

### INFORMATIONS



**Vous vous posez d'autres questions concernant votre traitement? N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou votre pharmacien.**

- ❶ Ce document informatif a été élaboré par des pharmaciens hospitaliers et médecins du CHU UCL Namur et du HOST RHN. Cette fiche n'est pas exhaustive : pour une information plus complète sur le médicament et ses effets indésirables, veuillez-vous référer à la notice qui se trouve dans la boîte de votre médicament.
- ❶ Retrouvez l'ensemble des fiches médicaments en ligne sur notre site web : [chuuclnamur.be/vos-medicaments](http://chuuclnamur.be/vos-medicaments).

# TARGOCID®

## 400 mg

(teicoplanine)

Nom du patient : \_\_\_\_\_

Médecin ayant initié le traitement (cachet) : \_\_\_\_\_

Dose : \_\_\_\_\_ flacon(s) de \_\_\_\_\_ mg \_\_\_\_\_ fois par jour

par voie intraveineuse

Date de début : \_\_\_\_\_

Durée/Date de fin : \_\_\_\_\_

## Pourquoi prenez-vous la Teicoplanine?

La Teicoplanine est un antibiotique utilisé pour traiter certaines infections causées par des bactéries.

## Comment prendre la Teicoplanine?

- ✦ La Teicoplanine est administrée par voie intraveineuse (dans une veine).
- ✦ Un(e) infirmier(e) viendra vous administrer la Teicoplanine une fois par jour à votre domicile.
- ✦ **Il/elle effectuera toutes les manipulations.**
- ✦ Le médecin suivra les concentrations du médicament dans le sang car la dose efficace de Teicoplanine peut varier d'une personne à l'autre. Elle est susceptible d'être modifiée au cours du traitement en fonction des résultats.

### 1. RECONSTITUTION

Après désinfection du flacon, l'infirmier(e) y ajoutera **lentement** la totalité du solvant fourni pour la reconstitution. Il/elle fera tourner **délicatement\*** le flacon entre ses mains jusqu'à dissolution complète de la poudre (couleur jaunâtre à jaune foncé).

\*Si la solution devient mousseuse, elle doit être laissée au repos pendant environ 15 minutes.

### 2. DILUTION

L'infirmier(e) prélèvera la solution du flacon avec une seringue. La quantité prélevée dépend de la dose sachant que 3 mL = 400 mg. Il/elle désinfectera le site d'injection d'une poche de perfusion (NaCl 0,9% ou glucose 5% 100mL) puis y injectera le contenu de la seringue. Il/elle homogénéisera ensuite la poche.

### 3. ADMINISTRATION

L'infirmier(e) connectera la poche à votre cathéter. Le liquide s'écoulera dans votre veine pendant 30 minutes.

## Quels sont les effets indésirables possibles avec la Teicoplanine?

A côté de ses effets bénéfiques, la Teicoplanine peut présenter des effets indésirables, même si tous les patients n'y sont pas sensibles. Voici les effets indésirables principaux de la Teicoplanine. Le but est de vous informer pour que vous puissiez les reconnaître et les prendre en charge.

- ✦ **Diarrhées**, parfois nausées, vomissements.
- ✦ Maux de tête.
- ✦ **Eruptions cutanées** (boutons ou rougeurs sur la peau), **démangeaisons**.
- ✦ Acouphène, diminution ou **perte d'audition**, vertiges.
- ✦ **Augmentation des enzymes du foie** : cela sera contrôlé par des prises de sang réalisées par votre médecin.
- ✦ Diminution ou absence d'urine (toxicité des reins). Votre médecin contrôlera régulièrement votre fonction rénale avec des prises de sang.

## Soyez vigilant(e)

### CONTACTEZ VOTRE ÉQUIPE SOIGNANTE :

- ✦ Immédiatement si vous ressentez un des symptômes suivants :
  - réactions pendant l'administration = plaques rouges, rougeurs et démangeaisons surtout sur le visage, dans le cou et le haut du corps, parfois accélération du rythme du cœur, symptômes similaires à l'allergie (ci-dessous). C'est très rare, surtout lorsque la perfusion coule en minimum 30 minutes. Si ça arrive, l'infirmier(e) doit suspendre ou ralentir la perfusion ;
  - réaction allergique = réaction cutanée avec démangeaisons, chute de tension ;
  - gonflement brutal de la gorge, du visage ou de la bouche pouvant causer des difficultés à respirer, oppression de la poitrine ;
  - éruption cutanée qui apparait progressivement, douloureuse et/ou étendue à plusieurs parties du corps, avec des petites cloques sur la peau, qui peuvent être accompagnées de fièvre ;
  - acouphène, diminution ou perte d'audition ;
  - absence ou diminution de l'urine.
- ✦ En cas de diarrhée sévère ou persistante, ou en présence de sang ou de glaires dans les selles (substances translucides).
- ✦ En cas de fièvre (température supérieure à 38°C).
- ✦ Si les symptômes liés à l'infection ne s'améliorent pas ou s'aggravent.
- ✦ Si vous devez prendre un autre médicament.
- ✦ Si vous avez un effet indésirable inquiétant ou un nouveau symptôme inexpliqué.

## Comment conserver la Teicoplanine?

- ✦ Gardez les flacons de Teicoplanine hors de portée et de la vue des enfants.
- ✦ Conservez les flacons dans leur emballage à **température ambiante, à l'abri de la lumière et de l'humidité.**
- ✦ Evitez les endroits chauds et humides (comme la salle de bain).
- ✦ Après reconstitution des flacons ou dilution dans la poche par votre infirmier(e), la solution doit être immédiatement administrée.

## Conseils qui pourraient vous être utiles

- ✦ N'interrompez pas le traitement par Teicoplanine sans avis médical.
- ✦ Il est déconseillé de prendre la Teicoplanine pendant la grossesse et l'allaitement.
- ✦ La Teicoplanine peut interagir avec d'autres médicaments (par exemple cisplatine, furosémide...). Cela peut augmenter les effets indésirables de la Teicoplanine. Informez votre équipe soignante si vous devez prendre un autre médicament.
- ✦ Conservez toujours avec vous une liste complète et actualisée de vos médicaments (avec ou sans ordonnance), vitamines et autres produits naturels. Remettez-en une copie à votre médecin et pharmacien. Il est important de leur indiquer tout changement.
- ✦ Prévenez tout professionnel de la santé, intervenant dans votre traitement, de la prise de Teicoplanine (médecins, pharmaciens, dentistes, infirmiers à domicile...).
- ✦ Ne jetez pas les flacons restants à la poubelle (toxique pour l'environnement). Ramenez-les à votre pharmacien de ville ou à la pharmacie de l'hôpital.

## Notes personnelles

### INFORMATIONS



**Vous vous posez d'autres questions concernant votre traitement? N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou votre pharmacien.**

❶ Ce document informatif a été élaboré par des pharmaciens hospitaliers et médecins du CHU UCL Namur et du HOST RHN. Cette fiche n'est pas exhaustive : pour une information plus complète sur le médicament et ses effets indésirables, veuillez-vous référer à la notice qui se trouve dans la boîte de votre médicament.

❷ Retrouvez l'ensemble des fiches médicaments en ligne sur notre site web : [chuuclnamur.be/vos-medicaments](http://chuuclnamur.be/vos-medicaments).

# TYGACIL® TIGECYCLINE

50 mg

(tigécycline)

Nom du patient : \_\_\_\_\_

Médecin ayant initié le traitement (cachet) : \_\_\_\_\_

Dose : \_\_\_\_\_ flacon(s) de \_\_\_\_\_ mg \_\_\_\_\_ fois par jour

par voie intraveineuse

Date de début : \_\_\_\_\_

Durée/Date de fin : \_\_\_\_\_

## Pourquoi prenez-vous la Tigécycline?

La Tigécycline est un antibiotique utilisé pour traiter certaines infections causées par des bactéries.

## Comment prendre la Tigécycline?

- ✧ La Tigécycline est administrée par voie intraveineuse (dans une veine).
- ✧ Un(e) infirmier(e) viendra vous administrer la Tigécycline deux fois par jour à votre domicile.
- ✧ **Il/elle effectuera toutes les manipulations.**

### 1. RECONSTITUTION

Après désinfection du flacon, l'infirmier(e) y ajoutera 5,3 mL de solution (NaCl 0,9% ou Glucose 5%). Il/elle agitera **doucement** le flacon jusqu'à dissolution complète (+/- 60 secondes, couleur jaune à orange).

### 2. DILUTION

L'infirmier(e) prélèvera ensuite 5 mL\* du flacon avec une seringue. Il/elle désinfectera le site d'injection d'une poche de perfusion (NaCl 0,9% ou Glucose 5% 100 mL) puis y injectera le contenu de la seringue. Il/elle homogénéisera ensuite la poche.

\*On prélève 5 mL car le flacon est légèrement surdosé (+ 6%)

### 3. ADMINISTRATION

L'infirmier(e) connectera la poche à votre cathéter. Le liquide s'écoulera dans votre veine pendant 30 à 60 minutes.

## Quels sont les effets indésirables possibles avec la Tigécycline?

A côté de ses effets bénéfiques, la Tigécycline peut présenter des effets indésirables, même si tous les patients n'y sont pas sensibles. Voici les effets indésirables principaux de la Tigécycline. Le but est de vous informer pour que vous puissiez les reconnaître et les prendre en charge.

- ✧ **Nausées/vomissements**, diarrhées, douleurs au ventre parfois sévères (pancréatite).
- ✧ **Eruptions cutanées** (boutons ou rougeurs sur la peau), démangeaisons.
- ✧ **Sensibilité au soleil** (coups de soleil) : éviter de s'exposer au soleil.
- ✧ **Augmentation des enzymes du foie** : cela sera contrôlé par des prises de sang réalisées par votre médecin.
- ✧ Vertige, diminution de la glycémie.
- ✧ Chez les enfants : coloration jaune des dents, ralentissement de la croissance (contre-indication chez les enfants de moins de 8 ans).

## Soyez vigilant(e)

### CONTACTEZ VOTRE ÉQUIPE SOIGNANTE :

- ✧ Immédiatement si vous ressentez un des symptômes suivants :
  - forte douleur dans le haut du ventre qui peut irradier dans le dos et qui s'aggrave en respirant profondément, avec nausées/vomissements (pancréatite) ;
  - réaction allergique subite et sévère = réaction cutanée avec démangeaisons, chute de tension, gonflement brutal de la gorge, du visage ou de la bouche pouvant causer des difficultés à respirer, oppression de la poitrine ;
  - éruptions cutanées douloureuses et/ou étendues à plusieurs parties du corps qui peuvent être accompagnées de fièvre.
- ✧ En cas de diarrhée sévère ou persistante, ou en présence de sang ou de glaires dans les selles (substances translucides).
- ✧ En cas de fièvre (température supérieure à 38°C).
- ✧ Si les symptômes liés à l'infection ne s'améliorent pas ou s'aggravent.
- ✧ Si vous devez prendre un autre médicament.
- ✧ Si vous avez un effet indésirable inquiétant ou un nouveau symptôme inexpliqué.

## Comment conserver la Tigécycline?

- ✧ Gardez les flacons de Tigécycline hors de portée et de la vue des enfants.
- ✧ Conservez les flacons dans leur emballage à **température ambiante, à l'abri de la lumière et de l'humidité.**
- ✧ Évitez les endroits chauds et humides (comme la salle de bain).
- ✧ Après reconstitution des flacons ou dilution dans la poche par votre infirmier, la solution doit être immédiatement administrée.

## Conseils qui pourraient vous être utiles

- ✧ N'interrompez pas le traitement par Tigécycline sans avis médical.
- ✧ La Tigécycline ne doit pas couler dans la veine en même temps que certains médicaments (par exemple oméprazole, diazépam...). Votre médecin vérifiera les compatibilités.
- ✧ La Tigécycline peut interagir avec d'autres médicaments (par exemple contraceptifs féminins, ciclosporine, tacrolimus, certains anticoagulants, isotrétinoïne...). Cela peut augmenter les effets indésirables ou diminuer l'efficacité des médicaments. Informez votre équipe soignante si vous devez prendre un autre médicament.
- ✧ Conservez toujours avec vous une liste complète et actualisée de vos médicaments (avec ou sans ordonnance), vitamines et autres produits naturels. Remettez-en une copie à votre médecin et pharmacien. Il est important de leur indiquer tout changement.
- ✧ Prévenez tout professionnel de la santé, intervenant dans votre traitement, de la prise de Tigécycline (médecins, pharmaciens, dentistes, infirmiers à domicile...).
- ✧ La prise de Tigécycline est déconseillée chez les femmes enceintes ou qui allaitent et chez les enfants de moins de 8 ans.
- ✧ Ne jetez pas les flacons restants à la poubelle (toxique pour l'environnement). Ramenez-les à votre pharmacien de ville ou à la pharmacie de l'hôpital.

## Notes personnelles

### INFORMATIONS



**Vous vous posez d'autres questions concernant votre traitement? N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou votre pharmacien.**

❶ Ce document informatif a été élaboré par des pharmaciens hospitaliers et médecins du CHU UCL Namur et du HOST RHN. Cette fiche n'est pas exhaustive : pour une information plus complète sur le médicament et ses effets indésirables, veuillez-vous référer à la notice qui se trouve dans la boîte de votre médicament.

❷ Retrouvez l'ensemble des fiches médicaments en ligne sur notre site web : [chuuclnamur.be/vos-medicaments](http://chuuclnamur.be/vos-medicaments).